



**Basfoliar® Kelp**

**FERTILIZANTE NATURAL  
BIOESTIMULANTE**



# BASFOLIAR® KELP ES UN FERTILIZANTE NATURAL, PROMOTOR RADICULAR Y BIOESTIMULANTE METABÓLICO OBTENIDO DEL ALGA ECKLONIA MAXIMA

## Recomendaciones de uso

Puede ser aplicado al suelo en trasplante, al suelo mediante el sistema de riego y al follaje en cultivos establecidos.

| Cultivo          | Dosis a diluir en 1000 l de agua | Época, número e intervalos de aplicación                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trigo            | 300 a 400*                       | Tratamiento de semillas.                                                                                                                                        |
|                  | 0,5- 1lt                         | Desde macollaje hasta hoja bandera expandida.                                                                                                                   |
| Cebada           | 300 a 400*                       | Tratamiento de semillas.                                                                                                                                        |
|                  | 0,5- 1 lt                        | Desde macollaje hasta hoja bandera expandida.                                                                                                                   |
| Soja             | 200 a 300*                       | Tratamiento de semillas.                                                                                                                                        |
|                  | 0,5                              | Desde V4 a V6 (cuarta a sexta hoja) hasta R5 (Inicio llenado de granos).                                                                                        |
| Maíz             | 0,5                              | Desde V4 a V6 (cuarta a sexta hoja).                                                                                                                            |
|                  | 0,5                              | Desde VT (prefloración)                                                                                                                                         |
| Frutales pepita  | 1                                | Aplicar en prefloración junto con Basfoliar Boro para incrementar cuaje.                                                                                        |
|                  | 2                                | Para aumentar tamaño, aplicar durante el desarrollo del fruto, solo o en mezcla con 300 cc/100 l agua de Basfoliar Calcio.                                      |
| Frutales carozo  | 1                                | Aplicar en prefloración junto a 2-3 l/ha de Basfoliar Boro para aumentar cuaje.                                                                                 |
|                  | 2 a 3                            | Para aumentar tamaño, aplicar desde 60 días antes de cosecha en mezcla con Basfoliar K, repetir cada 15 días.                                                   |
| Citrus           | 2                                | Realizar aplicaciones en brotación de primavera y otoño en mezcla con Basfoliar Zn 55 y Basfoliar Mg.                                                           |
| Uva de mesa      | 2                                | Aplicar con granos de 4-5 mm hasta pinta.                                                                                                                       |
| Uva de vinificar | 2                                | Para incrementar cuaje, aplicar junto a Basfoliar Boro y Basfoliar Zn55.                                                                                        |
|                  | 3                                | Para aumentar la producción, aplicar con granos de 2-3 mm y repetir a los 15 días.                                                                              |
| Cerezo           | 2                                | Para aumentar el cuaje, aplicar con Basfoliar Boro .                                                                                                            |
|                  | 2 a 3                            | Para aumentar calibre.                                                                                                                                          |
| Kiwi             | 3                                | Para aumentar tamaño, realizar 4 aplicaciones, iniciar 15 días posteriores a la floración, repetir cada 15 días.                                                |
| Arándano         | 3 a 5 l/ha                       | Desde cuajo del fruto, cada 10 días, mezcla con Basfoliar Calcio.                                                                                               |
| Frutilla         | 2 a 3 l/ha                       | Aplicar cada 20 días desde brotación, mejora el calibre de la fruta.                                                                                            |
| Hortalizas fruto | 2                                | Aplicar 15 días postrasplante.                                                                                                                                  |
| Papa, batata     | 2 lt/ha                          | Realizar tratamiento de semillas por inmersión al 4%. Aplicar por vía foliar 20 días postemergencia, a dosis indicada.                                          |
| Ajo              | 2                                | Sumergir la semilla por 6-7 horas junto al fungicida y/o nematicida, en una solución al 1%, desde 10 cm de altura; pulverizar cada 20 días a la dosis indicada. |
| Hortalizas bulbo | 2                                | Aplicar a los 15 días posteriores al trasplante.                                                                                                                |
| Cucurbitáceas    | 2                                | Aplicar a los 14 días posteriores al trasplante, repetir a los 14 y 28 días.                                                                                    |
| Alfalfa          | 2 a 3 l/ha                       | Aplicar despues de cada corte junto con Nitrofoska Foliar.                                                                                                      |

Efectos de la aplicación: Incrementa la producción mejorando la calidad general. Incrementa eficiencia de la fructific. Aumenta el contenido de azúcares. Acelera el crecimiento vegetal. Acelera la madurez de los frutos. Otorga coloración a los frutos. Mejora el desarrollo de raíces. Promueve la diferenciación floral.

(\*) cc/100kg de semilla

## Características

Concentrado líquido puro extraído mecánicamente del citoplasma del alga Ecklonia maxima; conteniendo macro y micronutrientes, y componentes naturales. pH: 5,2

## Composición

Extracto de alga Ecklonia maxima concentrado.

Nitrógeno (N) ..... 0,49% p/v

Fósforo (P2O5) ..... 0,87% p/v

Potasio (K2O) ..... 0,26% p/v

Fitohormonas Auxinas libres ..... 75µg/L

(Actividad Fisiológica equivalente a 11 mg/L AIA)

Citoquininas ..... 0,031 mg/L

(Actividad Fisiológica equivalente)

## Acción en el cultivo

- Estimula la formación temprana de raíces y con ello un desarrollo vigoroso de las plantas desde la emergencia y/o establecimiento del cultivo.
- Contribuye a superar situaciones de estrés sufridas por los cultivos.
- Es versátil, ya que puede ser utilizado vía foliar, fertirriego, drench e inmersión.
- Otorga buen color y tamaño a los frutos.
- Promueve la diferenciación floral

## Ventajas

- Aplicación en la línea de siembra de las semillas asegurando rápido crecimiento y desarrollo de raíces
- Mayor eficacia del fertilizante en condiciones de sequía
- Desarrollo más uniforme de los cultivos en las primeras etapas
- Mejor y más profundo desarrollo de raíces
- Mayor capacidad de absorción de nutrientes y agua.
- Contiene Zn y otros microelementos como Fe y Mn que aseguran crecimiento óptimo.
- Garantiza buena germinación e implantación del cultivo.

## Presentación: Bidones de 1 lt y 5 lt

**Importante: Compatibilidad:** Basfoliar® Kelp es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común (insecticidas, funguicidas y herbicidas). No mezclar con productos de reacción alcalina. Efectuar las pruebas de compatibilidad correspondientes. Lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.

Distribuido por:

Las aplicaciones en etapas vegetativas tienen como objetivo sobrellevar deficiencias nutricionales asociadas a problemas de suelo o como estimulantes del crecimiento del cultivo. Las aplicaciones en etapas reproductivas, tienen como objetivo incrementar el rendimiento, activar el metabolismo, balancear la relación entre nutrientes y mejorar la sanidad del cultivo. Todos los productos son compatibles con la mayoría de los fungicidas del mercado.

**NOTA:** La información contenida en este folleto es netamente orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto consulte con su ingeniero agrónomo o técnico asesor. **Solicitar información técnica a: Tel.: (+54 11) 4545 3342 / [www.compo-expert.com.ar](http://www.compo-expert.com.ar)**