

CYTOAMINO 600®



- Bioestimulante líquido formulado para promover división celular, activación del metabolismo y movimiento de asimilados a la fruta.
- CYTOAMINO 600® contiene extracto de algas mas tecnología Stoller, ácido glutámico, ácido aspártico, ácidos carboxílicos y ácido policarboxílicos, alanina, y otros aminoácidos esenciales.
- Incrementa la concentración interna de moléculas internas en tejidos, promoviendo una mayor división celular y aumento de tamaño de frutos.
- Aumenta el movimiento de nutrientes al fruto, promoviendo una mejor condición.

Composición Química

Ácidos Carboxílicos	1,2%
Policarboxílicos	7%
Aminoácidos esenciales	6,8%

Valores Expresados en % peso/volumen


pH	2.29 (a 20°C)
Da	1.00 (g/ml)

*Cytoamino 600® posee una actividad citoquinina equivalente a 600 ppm a la dosis recomendada.

+ División Celular

+ Calibre

+ Asimilados y Condición



+K

+Ca

+Mg

+MS

Los derivados de la adenina y los complejos amínicos promueven un mayor número de células, mayor actividad hormonal en el tejido e incrementan el movimiento de nutrientes y azúcares a la fruta, mejorando el contenido de materia seca y minerales.

CYTOAMINO 600®



• Instrucciones de uso

Cultivo	Nº Aplicaciones	Dosis	Aplicación
Cerezos	3	1,5 L/ha	Plena Flor, caída pétalos, caída de chaqueta.
Manzanos y perales	2	1,5 L/ha	50% caída de pétalos, y 7 días después.
Papa	2	0,5 L/ha	Inicio de tuberización y 10-15 días después.
Ajos y cebolla	2	1,5 L/ha	40-45 días después de trasplante y 15 días después.
Arándano, nectarín, ciruelo, avellano europeo, nogal, palto, almendro	3	1 - 1,5 L/ha	Plena flor, fruto cuajado e inicio de crecimiento de fruto.
Frutillas, frambuesas y moras	3	0,5 - 1 L/ha	Aplicar en floración y repetir cada 7 días.
Cítricos	3	1,5 - 2 L/ha	Plena Flor, fruto cuajado y fruto de 7 a 10 mm.
Uva de Mesa	3	1,5 L/ha	Aplicar en conjunto con las aplicaciones de giberélico de crecimiento.
Trigo, maíz, raps y cebada	1	1-1,5 L/ha	Aplicar durante la etapa de floración y repetir según necesidad.

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2- CYTOAMINO 600
- 3- Agroquímico

Stoller en su región es:

XV Región
Alvaro Villarreal
+56 9. 3 224 0339

III Y IV Región
Ulises Pizarro
+56 9. 9 534 2016
Felipe Pizarro
+56 9. 3 443 3941

V Región
Luisa Baeza
+56 9. 6 845 3268

Región Metropolitana
Oriana Reyes
+56 9. 4 248 8538
Josefa Bitsch
+56 9. 3 379 4332

VI Región
Alejandro Guajardo
+56 9. 8 916 2012
Nicolás Torres
+56 9. 9 451 4354

VII Región
Paula Vargas
+56 9. 9 451 4384
Nicole Guzmán
+56 9. 3 469 1858

VIII Región
Luis Milla
+56 9. 9 630 6790

IX Región
Camilo Quezada
+56 9. 4 010 6875

XIV y X Región
Antonio Villagra
+56 9. 9 537 5239

Jefe Regional Zona Norte
(III a VI)
Fredy Morales
+56 9. 9 451 4385

Jefe Regional Zona Sur
(VII a XIV)
Claudio Romero
+56 9. 9 161 8424



Para consultas técnicas contactarse con él
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A.
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó, Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.