

- **ROOTFEED CONCENTRATE** es un fertilizante y bioestimulante enraizante formulado a partir de carbamida cálcica y magnesio, para ser aplicado vía riego tecnificado.
- **ROOTFEED CONCENTRATE** promueve el desarrollo radicular constante y entrega nitrógeno amínico, calcio y magnesio a la planta.
- **ROOTFEED CONCENTRATE** estimula el crecimiento radicular de forma continua, incrementa la absorción de nutrientes y síntesis hormonal, aumenta la productividad y calidad de la fruta.

CONDICIONES DE VENTA

- 1.- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
- 2.- Debido a que el almacenamiento, época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, éste no se responsabilizará por eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento inadecuado del producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Como no es posible conocer la reactividad de todas las formulaciones existentes en el mercado, se recomienda hacer una prueba de mezcla para comprobar compatibilidad teniendo en consideración que el orden de la mezcla dependerá de los productos, sus formulaciones y pH, entre otros.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Evitar contacto directo con el suelo y otros productos.

RootFEED Concentrate



CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
Cultivos bajo invernadero.	5 - 10 L/Ha	Aplicar desde el primer riego efectivo y durante el desarrollo del fruto, repitiendo cada 15 días según sea necesario.
Frutales caducos: Almendro, Avellano Europeo, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraznero, Kiwi, Manzano, Naranja, Nectarín, Nogal, Peral. Frutales menores: Arándano, Frambueso, Frutilla.	10 - 25 L/Ha	Aplicar desde inicio de temporada repitiendo cada 15 días según sea necesario.
Frutales persistentes: Limonero, Mandarino, Naranja, Olivo, Palto.	10 - 25 L/Ha	Aplicar desde inicio de floración y durante el desarrollo del fruto, repitiendo cada 15 días.
Plantaciones nuevas.	5 - 15 L/Ha	Aplicar desde el primer riego efectivo después de plantación y repetir cada 15 días según sea necesario. Se recomienda aplicar BIO-FORGE® 6 a 10 días post trasplante para disminuir estrés.
Vid de Mesa, Vid Vinífera.	10 - 25 L/Ha	Aplicar desde brote 5 cm repitiendo cada 15 días según sea necesario.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno Amínico (NH ₂)	9%
Calcio (CaO)	11%
Magnesio (MgO)	2,4%

(Valores expresados en % peso/volumen)

pH	4,5
Densidad (g/L)	1279 g/L a 20°C
Solubilidad (%)	100% a 20°C

METALES PESADOS (mg/kg)

Arsénico (As)	<0,5
Plomo (Pb)	<0,5
Cadmio (Cd)	<0,5
Mercurio (Hg)	<0,5

Límite establecido analítico 0,5 mg/kg

